



経皮吸収型 アレルギー性鼻炎治療剤

処方箋医薬品（注意—医師等の処方箋により使用すること）

エメダスチンフマル酸塩経皮吸収型製剤

薬価基準収載

アレサガ® テープ 4mg
8mg
ALLESAGA® Tapes

添付文書の電子化・同梱廃止に伴う包装仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は当社商品に格別のご高配をいただき、厚く御礼申し上げます。経皮吸収型 アレルギー性鼻炎治療剤 アレサガテープ4mg、同8mgにつきまして、添付文書の電子化・同梱廃止に伴い包装仕様の変更をいたしますので、下記の通りご案内申し上げます。

今後とも、なお一層のご愛顧をいただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

謹白
久光製薬株式会社

変更内容

薬袋の英字表記を変更しました。（サイズの変更はありません。）

変更品



※掲載の図は、実際の製剤とサイズ・比率が異なります。

薬袋結束バンドの色を変更しました。

現行品



変更品



※4mgを例に記載しています。8mgも同様に変更しました。 ※掲載の図は、実際の製剤とサイズ・比率が異なります。

出荷予定時期

※統一商品コード、GS1コード等の各種コードに変更はありません。

※変更品の出荷時期は、在庫状況により前後する場合があります。

製品名	包装	製造番号	使用期限	当社からの出荷予定時期
アレサガテープ4mg	70枚	Y101T以降	2024年12月	2022年2月上旬
アレサガテープ8mg	70枚	Y101T以降	2024年12月	2022年2月上旬

変更の際しましては、変更前と変更後の商品が流通いたします。ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承くださいませようお願い申し上げます。

文献請求及び問い合わせ先

久光製薬株式会社 お客様相談室

〒100-6330 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号 フリーダイヤル0120-381332

FAX. (03) 5293-1723 受付時間/9:00-17:50(土日・祝日・会社休日を除く)

作成：久光製薬株式会社

2022年1月作成


ALTPA044R00d

変更内容

販売包装単位のサイズを縮小しました。
サイズ変更に伴い、デザインを変更しました。



変更品



70枚(1枚/1袋×70袋)



■全包装サイズを縮小しました。 横×高さ×奥行き 単位:mm

	現行品			変更品			
4mg 70枚包装	73	37	78	▶	71	37	75
8mg 70枚包装	88	37	78	▶	86	37	75

※4mgを例に記載しています。8mgも同様に変更しました。
※掲載の図は、実際のサイズ・比率が異なります。

元梱包装単位のサイズを縮小しました。
サイズ変更に伴い、デザインを変更しました。



変更品

70枚(1枚/1袋×70袋)×50箱

■全包装サイズを縮小しました。 横×高さ×奥行き 単位:mm

	現行品			変更品			
4mg 70枚包装	378	198	174	▶	369	197	164
8mg 70枚包装	453	198	174	▶	444	197	164

※4mgを例に記載しています。8mgも同様に変更しました。
※掲載の図は、実際のサイズ・比率が異なります。



説明書のデザインを変更し、入数を1枚に変更しました。

全体のフォントをUDフォント(ユニバーサルデザインフォント)に変更しました。合わせて薬袋のイラストを変更しました。

表面

経皮吸収型 アレルギー性鼻炎治療剤
アレサガテープ4mg を使用されている方へ
アレサガテープ8mg

※4mg、8mgのお薬があります。使い方はいずれも同じです。

貼り方

このお薬は貼付剤(貼る薬)です。包装袋の中にお薬が1枚ずつ入っています。あらかじめ貼る場所をよく拭いて清潔にしてください。また、水分や汗を十分に取ってください。

1. 包装袋の2か所を切り取って薄いベージュ色のテープと透明なフィルムを同時につまみ、ゆとりを取り出してください。

2. お薬には、緑色でお薬の名前と「ここからはがす」と表示された透明なフィルムが付いています。(薄いベージュ色の方がお薬です。)このフィルム面を上にして、フィルム中央の波型の部分をつまみます。(お薬を軽く2つ折にするとつまみやすくなります。)次に、どちらか一方のフィルムをはがします。貼り付ける面に指がふれないように注意してください。

3. 残りのフィルムをつかんだまま、貼る場所(胸、上腕、背中、お腹のいずれか)にフィルムの無い方を貼り、手で軽くおさえてください。残りのフィルムをすずしなら全体を貼っていきます。

4. 貼った後は、手のひらでしっかり押さえてください。

5. テープを貼った後は、手を流水でよく洗ってください。

裏面

使用するときの注意

- このお薬は有効成分が皮膚から吸収されるお薬です。必ず医師または薬剤師の指示に従って使用してください。(貼る回数・貼る枚数など)また、このお薬を家族や他人にゆずってはいけません。
- このお薬は1日1回、例えば入浴後の汗がひいた後などに時間帯を決めて貼りかえてください。

胸、上腕、背中、お腹

●示した胸、上腕、背中、お腹のいずれか1か所に貼ってください。

- 傷口や湿疹等のあるところには貼らないでください。
- このお薬は1度がししたら、再び貼り直すことができません。途中ではがれ落ちた場合は新しいお薬を貼ってください。また、貼り替え予定時間には新しいお薬を貼ってください。
- 同じところに続けて貼ると、かゆくなったり、赤くなったり、かぶれたりすることがあるので、新しいお薬に貼りかえる時は、同じところを避けて貼ってください。
- お薬の使用中は車の運転など危険を伴う機械の操作は避けてください。眠気が起こることがあります。

保管上の注意・捨てるときの注意

- お薬は使用するまで包装袋を開けず、直前に開封し、速やかに貼ってください。
- 高温を避け、子供の手の届かないところに保管してください。
- 捨てる時にも子供が誤って貼らないよう(粘着面を内側に2つに折るなど)注意してください。
- このお薬の包装袋はプラスチック製です。捨てるときは各自自治体の分別ルールに従ってください。

このお薬を使って、何か異常が認められた場合には、医師または薬剤師に相談してください。

久光製薬株式会社
3,23304
ALTS003R024

■説明書の入数

	現行品	変更品
4mg 70枚包装	5枚 ▶	1枚
8mg 70枚包装	5枚 ▶	1枚

説明書を追加でご希望される場合は、医療関係者向け情報サイトである **Hisamitsu サポートウェブ** 内の 資料オンラインオーダーから、データのダウンロードや 資料をご注文頂けます。

久光サポートウェブ <https://www.hisamitsu-pharm.jp>

