

—— 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。 ——

## 使用上の注意改訂のお知らせ

2023年5-6月

### 経皮吸収型 エストラジオール製剤

エストラジオール経皮吸収型製剤

処方箋医薬品<sup>注)</sup>

エストラーナ<sup>®</sup>テープ<sup>°</sup> 0.09mg ESTRANA<sup>®</sup> Tapes 0.09mg  
エストラーナ<sup>®</sup>テープ<sup>°</sup> 0.18mg ESTRANA<sup>®</sup> Tapes 0.18mg  
エストラーナ<sup>®</sup>テープ<sup>°</sup> 0.36mg ESTRANA<sup>®</sup> Tapes 0.36mg  
エストラーナ<sup>®</sup>テープ<sup>°</sup> 0.72mg ESTRANA<sup>®</sup> Tapes 0.72mg

注) 注意-医師等の処方箋により使用すること

製造販売元



久光製薬株式会社

〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地

このたび、標記製品の**使用上の注意**を以下のとおり改訂いたしましたのでご案内申し上げます。今後のご使用に際しましては、以下の内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

#### 【改訂内容】

[\_\_\_\_ : 下線部改訂箇所]

改訂後	現行
14. 適用上の注意 14.1 薬剤交付時の注意 14.1.1~14.1.3 (略) 14.1.4 0.09mg 製剤及び0.18mg 製剤を使用する場合、未使用分は本剤が入っていた袋に戻し、開口部を2回折り曲げて保管し、開封後 <u>30</u> 日以内に貼付するように指示すること。	14. 適用上の注意 14.1 薬剤交付時の注意 14.1.1~14.1.3 (略) 14.1.4 0.09mg 製剤及び0.18mg 製剤を使用する場合、未使用分は本剤が入っていた袋に戻し、開口部を2回折り曲げて保管し、開封後12日以内に貼付するように指示すること。

#### 【改訂理由】

開封後、開口部を2回折り曲げて保管したエストラーナテープ0.09mg及びエストラーナテープ0.18mgについて、安定性試験（開封試験）により開封後30日間の安定性が確認されたため。

---

【お問い合わせ先】

**久光製薬株式会社 お客様相談室**

〒135-6008 東京都江東区豊洲三丁目3番3号  
TEL. 0120-381332 FAX. (03)5293-1723  
受付時間／9:00－17:50（土日・祝日・会社休日を除く）

「独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ(<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>)」に改訂後の電子化された添付文書及び医薬品安全対策情報(DSU)が掲載されますので、ご参照ください。また、以下のバーコードを「添文ナビ」で読み取ることで、電子化された添付文書及び関連文書を閲覧いただけます。

エストラーナテープ0.09mg、同テープ0.18mg、同テープ0.36mg、同テープ0.72mg

